

去甲斑蝥素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_8E_BB_E7_94_B2_E6_96_91_E8_c22_314227.htm 药品名称去甲斑蝥素
药物别名依尔康 英文名称Norcantharidin 类别其他抗肿瘤药及
辅助治疗药性状无色结晶性粉末，无臭，稍有刺激性。略溶
于水及乙醇，易溶于热水、丙酮。制剂片剂：每片5mg。注
射剂：每支10mg（2ml）。分子式成分本品为国内创制的合成
抗肿瘤新药。药理及应用对肝癌、食管鳞癌等细胞株的形态
、增殖有破坏或抑制作用，可提高癌细胞呼吸控制率及溶酶
体酶活性，干扰癌细胞分裂，抑制其DNA合成。对骨髓细胞
无抑制作用，并能升高白细胞。吸收后在肝、肾、胃、肠、
癌组织中均有较高药物浓度。给药后15分钟在肝脏、癌组织
达高峰浓度，6小时后浓度显著下降，24小时内大部分经肾脏
排泄，体内蓄积甚少。临床用于肝癌、食管癌、胃及贲门癌
等以及白细胞低下症，亦可作为术前用药或用于联合化疗，
与其他化疗药物联用能提高疗效、减少副作用。用于乙型肝炎
亦有效。用法用量口服：1次5～20mg（重症可加至30mg）
，1日3次，空腹服。静注或静滴：1日10～20mg，溶入适量葡
萄糖注射液内缓慢推注，或加入葡萄糖注射液250～500ml中
缓慢点滴。注重事项不良反应较少见，但口服剂量过大时可能
出现恶心、呕吐等症状，应减量或停药。100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com