

盐酸苯乙双胍 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E8_8B_AF_E4_c22_314309.htm 药品名称盐酸苯乙双胍
药物别名苯乙福明，降糖灵 英文名称Phenformin Hydrochloride
类别胰岛素及其他影响血糖的药物制剂片剂：25mg、50mg。
药理毒理不刺激胰岛素分泌，主要通过抑制葡萄糖在肠内的吸收，促进组织对葡萄糖的摄取，增加葡萄糖的利用，对糖尿病人有降血糖的作用，对正常人则无降血糖的作用。药动学口服吸收迅速，T_{1/2}为3h~5h，主要在肝内代谢，经肾排泄。适应症经饮食治疗不能控制的或经磺酰脲类治疗II型糖尿病，非凡适用于经磺酰脲类治疗后体重增加的肥胖病人，除控制饮食外使用。不良反应乳酸酸中毒发生率较高(有时可致命)，临床表现为呕吐、腹痛、过度换气、神志不清、血中乳酸浓度增加。用法用量口服，开始25mg/次，2次/日，餐前服用，一般剂量50mg~75mg/日。最高剂量100mg~150mg/日，否则易发生乳酸酸中毒。注重事项易发生乳酸酸中毒的心衰、腹水、急性或慢性酒精中毒病人及糖尿病高渗性昏迷、酮症酸中毒、急性发热及肝、肾功能不全者禁用。避免与碱性溶液或饮料同服。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com