

雷公藤总甙〔基〕 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E9\\_9B\\_B7\\_E5\\_85\\_AC\\_E8\\_97\\_A4\\_E6\\_c22\\_314311.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E9_9B_B7_E5_85_AC_E8_97_A4_E6_c22_314311.htm) 药品名称雷公藤总甙

〔基〕 药物别名雷公藤甙，雷公藤多苷 英文名  
Tripterygium Glycosides 类别免疫抑制剂 药理及应用本品是卫矛科植物雷公藤（*Tripterygium wilfordii*）的去皮根部提取的总甙。实验证实，本品具有较强的抗炎及免疫抑制作用。在抗炎作用方面，它能拮抗和抑制炎症介质的释放及实验性炎症及关节炎的反应程度。在抑制免疫作用方面，它能抑制T细胞功能，抑制延迟型变态反应，抑制白介素-1的分泌，抑制分裂源及抗原刺激的T细胞分裂与繁殖。可用于类风湿关节炎，红斑狼疮、皮炎、白塞综合征、肾小球肾炎等。不良反应不良反应主要为胃肠反应，一般可耐受。可能产生白细胞减少；偶可见血小板减少；停药后可恢复。用法用量口服，1日剂量1~1.5mg/kg，分次服。一般为10mg/次，1日4次，或20mg/次，1日3次。病情控制后可减量或间歇疗法。1个月为一疗程，常用其片剂，每片10mg。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)