

复方克霉唑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022_E5_A4_8D_E6_96_B9_E5_85_8B_E9_c22_314328.htm 药品名称复方克霉唑
英文名称Compound Clotrimazole 类别皮肤科用药制剂克霉
唑1.5%及尿素15%。软膏：1.5%(按克霉唑C₂₂H₁₇CIN₂计)。
分子式成分克霉唑、尿素。药理毒理克霉唑属吡咯类抗真菌
药，对白念珠菌则可抑制其自芽孢转变为侵袭性菌丝的过程
。克霉唑具广谱抗真菌活性，对表皮癣菌、毛发癣菌、曲菌
、着色真菌、隐球菌属和念珠菌属均有较好抗菌作用，对申
克氏孢子丝菌、皮炎芽生菌、粗球孢子菌属、组织浆胞菌属
等也有一定抗菌活性。克霉唑曲霉、某些暗色孢科、毛霉菌
属等作用差。本品通过干扰细胞色素P-450的活性，从而抑制
真菌麦角固醇等固醇的生物合成，损伤真菌细胞膜并改变其
通透性，以致重要的细胞内物质外漏；可抑制真菌的甘油三
脂和磷脂的生物合成；也可抑制氧化酶和过氧化酶的活性，
引起细胞内过氧化氢积聚导致细胞亚微结构变性和细胞坏死
。药动学本品局部应用后可穿透表皮，皮肤中浓度为1.53
~ 100mg/ml，其中角质层中浓度最高，可达50 ~ 100mg/ml仅
微量吸收至全身。阴道应用后吸收量亦甚微。适应症白色念
珠菌所致的皮肤念珠菌病和外阴阴道炎，由红色毛癣菌、须
癣毛癣菌、絮状表皮癣菌和犬小孢子菌所致的体癣、股癣、
足癣和糠秕马拉色菌所致的花斑癣，也可用于治疗甲沟炎、
须癣和头癣。不良反应皮肤外用后偶可发生皮疹、水泡、烧
灼感、瘙痒、充血或其他皮肤刺激征象。相互作用本品与制
霉菌素、两性霉素B及氟胞嘧啶合用时对白念珠菌无协同作用
。用法用量1. 皮肤感染涂于患处，一日2~3次。2. 阴道炎

阴道用药，一次0.15g，每晚1次，连续7日。注意事项对本品任何组分过敏者禁用。 1. 避免接触眼睛。 2. 外用本品偶可致皮肤局部过敏，一旦发生，应即停用。 3. 用本品治疗皮肤念珠菌病时，避免将敷料紧压在药品上或封包，以避免酵母菌生长。 #093. 妊娠中、后期应用未发现对胎儿有不良影响。然而，妊娠早期缺乏合适的、与良好对照的研究。但在小鼠和大鼠研究中，大剂量时具有胚胎毒性，但未发现有畸变。孕妇应权衡利弊后决定是否应用。本品缺乏是否经乳汁分泌的资料。但由于许多药物经乳汁分泌，哺乳期妇女应慎用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com