

碘他拉葡胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E7_A2_98_E4_BB_96_E6_8B_89_E8_c22_314333.htm 药品名称碘他拉葡胺
药物别名异泛影葡胺、碘酞葡胺、康瑞 英文名称Meglumine
Iothalamate 类别造影剂制剂注射液：10ml(60%)、20ml(60%)
、50ml(60%)、100ml(60%)。复方碘他拉葡胺注射液(含10%异
泛影酸钠和68%碘他拉葡胺)：20ml(78%)；50ml(78%)。适应
症泌尿系统造影，也用于心脏大血管、脑血管造影、静脉和
四肢动脉造影等。不良反应有恶心、呕吐、荨麻疹、咽喉瘙
痒及灼热感等。用法用量静注：泌尿系统造影20ml；脑血管
造影10ml；逆行肾盂造影5ml～20ml。脑室造影6ml，用等量
脑脊液稀释注入脑室；四周血管造影：20ml～40ml。注重事
项甲亢、肝肾功能损害、活动性肺结核及对碘过敏患者禁用
。副作用较泛影葡胺明显，不宜作脑血管造影。100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com