

左旋咪唑〔典〕〔基〕 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_B7_A6_E6_97_8B_E5_92_AA_E5_c22_314339.htm 药品名称左旋咪唑〔典〕〔基〕 药物别名左咪唑，L-Tetramisol 英文名称Levamisole 类别生物反应调节剂制剂片剂：盐酸盐，每片25mg；50mg。 药理及应用能使免疫缺陷或免疫抑制的宿主恢复其免疫功能，对正常机体的影响并不显著。它能使年老小鼠免疫功能低下状态恢复到正常。在体外，可使巨噬细胞数增加并使巨噬细胞吞噬的颗粒增多。它虽无抗微生物的作用，但可提高宿主对细菌及病毒感染的抵抗力。目前试用于肺癌、乳腺癌手术后或急性白血病、恶化淋巴瘤化疗后作为辅助治疗。此外尚可用于自体免疫性疾病如类风湿性关节炎、红斑性狼疮以及上感、小儿呼吸道感染、肝炎、菌痢、疮疖、脓肿等，对顽固性支气管哮喘经试用初步证实近期疗效显著。说明为四咪唑（驱虫净）的左旋体，其活性约为混旋体（四咪唑）的1~2倍。原用为驱肠虫药，近年发现对免疫功能亦有影响。 用法用量（1）癌瘤的辅助治疗：1日量150~250mg，连服3日，休息11日，然后再进行下一疗程。（2）治疗类风湿性关节炎等：每日服2~3次，每次50mg，可连续服用。（3）治支气管哮喘：每服50mg，1日3次，连服3日，停药7日，6个月为一疗程。 注重事项偶有头晕、恶心、呕吐、腹痛、食欲不振、发热、嗜睡、乏力、皮疹、发痒等，停药后能自行缓解。个别病人可有白细胞减少、剥脱性皮炎及肝功损伤。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com