

锝依替菲宁 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_E9\\_94\\_9D\\_E4\\_BE\\_9D\\_E6\\_BF\\_E8\\_c22\\_314391.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022_E9_94_9D_E4_BE_9D_E6_BF_E8_c22_314391.htm) 药品名称锝依替菲宁药物别名 $^{99m}\text{Tc}$ -EHIDA 英文名称Technetium #093. Etifenin类别造影剂分子式成分锝[ $^{99m}\text{Tc}$ ]依替菲宁适应症肝胆显像。用于急性胆囊炎、先天性胆系病变、黄疸的鉴别诊断和慢性胆囊炎、胆结石的辅助诊断。用法用量静注，185 MBq ~ 370MBq(5mCi ~ 10mCi)/次。注射后5、10、15、20、25、30、45及60min各采集图像一次。必要时延迟至2h ~ 24h。正常肝清楚显影时间<30min；肠道出现放射性<60min。注意事项检查前至少禁食4h，以免影响胆囊显影。血清胆红素高于85.5(mol/L) ~ 171.0(mol/L)时，肝脏吸收 $^{99m}\text{Tc}$ -EHIDA受到抑制，肝胆可显影不良。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)