

植物血凝素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E6\\_A4\\_8D\\_E7\\_89\\_A9\\_E8\\_A1\\_80\\_E5\\_c22\\_314392.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E6_A4_8D_E7_89_A9_E8_A1_80_E5_c22_314392.htm) 药品名称植物血凝素  
药物别名植物血球凝集素，PHA 英文名称Phytohemagglutinin  
类别生物反应调节剂制剂注射用植物血凝素：每支含冻干粉剂10mg。药理及应用能激活小淋巴细胞转化为淋巴母细胞，继而分裂增殖，释放淋巴因子，并能提高巨噬细胞的吞噬功能。尚能促进骨髓造血机能，使白细胞数上升；对病毒侵袭的细胞有杀伤作用，并有诱生干扰素的作用。在体外能抑制人体食管癌及肝癌细胞株，对艾氏腹水癌亦有抑制作用。临床用于免疫功能受损引起的疾病，如急性白血病（急淋、急粒）、晚期绒癌及恶性葡萄胎、乳癌、肠癌、鼻咽癌、再生障碍性贫血、迁延性肝炎等。贮存于2~8℃冰箱中，使用时新鲜配制注射液。说明为低聚糖（由D-甘露糖、氨基葡萄糖酸衍生物所构成）与蛋白质的复合物，属于高分子糖蛋白类，存在于一些豆类种子中，对红细胞有一定凝集作用，故名。用法用量（1）用于肿瘤：天天20~40mg，溶于5%葡萄糖盐水250~500ml中静滴，或溶于5%葡萄糖液或0.9%氯化钠注射液40ml中静脉缓慢推入；也可溶于0.9%氯化钠注射液供肌注。宜与其他疗法（手术、化疗、放疗）综合治疗。按病种不同，或在化疗之前使用本品5~10天。或在化疗后使用5~10天。按此序贯疗法，一般需用2~3个疗程。（2）用于迁延性肝炎：1日量为10~20mg，每日1次静滴，20日为一疗程。注重事项少数病例曾出现一过性过敏反应，偶见过敏性休克。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)