

醋酸氟轻松软膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E9\\_86\\_8B\\_E9\\_85\\_B8\\_E6\\_B0\\_9F\\_E8\\_c22\\_314400.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E9_86_8B_E9_85_B8_E6_B0_9F_E8_c22_314400.htm) 药品名称醋酸氟轻松软膏

药物别名肤轻松，氟西奈德 Synalar 英文名称Fluocinonide Ointment 类别皮肤科用药制剂软膏剂：0.025%；10g：2.5mg

；20g：5mg。本品为乳剂型基质的白色软膏分子式成分化学

名称为：11 - 羟基 - 16 ， 17 - [(1-甲基亚乙基)-双（氧）]-21-(乙酰氧基)-6 ， 9-二氟孕甾-1，4-二烯-3，20-二酮。

分子式：C<sub>26</sub>H<sub>32</sub>F<sub>2</sub>O<sub>7</sub>。分子量：494.53药理毒理肾上腺皮质

激素类药。外用可使真皮毛细血管收缩，抑制表皮细胞增殖或再生，抑制结缔组织内纤维细胞的新生，稳定细胞内溶酶体膜，防止溶酶体酶释放所引起的组织损伤。具有较强的抗炎及抗过敏作用。

适应症过敏性皮炎、接触性皮炎、脂溢性皮炎、湿疹、皮肤搔痒症、银屑病、神经性皮炎等。不良反应长期或大面积应用，可引起皮肤萎缩及毛细血管扩张，发生痤疮和毛囊炎，偶致接触性皮炎。

用法用量外用涂于患处，2~3次/日。#093.一周总量不得超过50g软膏。每日涂用多次，连用数日，可致耐药性，每日涂药次数不宜太多，可间断用药。

注重事项对并发细菌感染的皮肤病，应与相应的抗生素配用；真菌性或病毒性皮肤病禁用，对本药及基质成分过敏者和对其他皮质类固醇过敏者禁用。用于破损皮肤，长期应用可吸收引起全身性作用。

对并发细菌感染的皮肤病，应与相应的抗生素配用，如感染未改善应停用。本品不能长期大面积应用。#093.应权衡利弊后慎用，孕妇不能长期、大面积或大量使用。#093.由于婴儿、儿童体表面积相对较大，

应尽可能减少药物用量，用药时间不宜过长且不能采用封包治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)