

醋酸氯己定痔疮栓 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E9_86_8B_E9_85_B8_E6_B0_AF_E5_c22_314409.htm 药品名称醋酸氯己定痔疮栓 英文名称Chlorhexidine Acetate Suppositories 类别皮肤科用药制剂本品为乳白色栓剂。20mg 分子式成分c化学名：1,6-双（N1-对氯苯基-N5-双胍基）己烷二醋酸盐。分子式：C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀2C₂H₄O₂。分子量：625.56。药理毒理本品为双胍类化合物，通过改变细菌胞浆膜的通透性使细胞内容物漏出，而起到杀菌作用。部分葡萄球菌属、变异链球菌、唾液链球菌、大肠埃希菌、丙酸杆菌和白念珠菌对本品敏感；嗜血链球菌呈中度敏感；本品对变形杆菌属、假单胞菌属、克雷伯菌属和革兰阴性球菌等作用微弱。药动学肠道吸收差。适应症内痔、外痔等肛肠疾病及手术前后的消毒和预防感染。不良反应偶见皮肤过敏或接触性皮炎。相互作用本品不宜与肥皂、阴离子表面活性剂、碘化钾等合用。用法用量直肠给药。一次20mg，一日1~2次。使用前将手和肛门洗净，将塑料硬片从下端缺口处撕开，取塑料指套一只，套在食指上，取出栓剂，持栓剂下端，轻轻塞入肛门。注重事项对氯己定过敏者禁用。高浓度时对粘膜有刺激作用，避免接触眼睛及其他敏感组织。只作直肠给药。切忌口服。当药品性状发生改变时禁止使用。#093.尚不明确。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com