

醋酸泼尼松龙滴眼剂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E9_86_8B_E9_85_B8_E6_B3_BC_E5_c22_314422.htm 药品名称醋酸泼尼松龙滴眼剂 药物别名百力特 Pred Forte 英文名称prednisolone acetate 类别皮肤科用药制剂滴眼剂 1% x 5 mL 分子式成分化学名为：11 β ，17 β ，21-三羟基孕甾-1，4-二烯-3，20-二酮-21-醋酸酯。本药是一种合成的皮质类固醇类药物，白色结晶状物质，熔点约为235 $^{\circ}$ C，在此熔点时有部分醋酸泼尼松龙分解。其分子式为C₂₃H₃₀O₆，溶于甲醇，其吸收紫外线的最大值为242 nm。分子量：402.49。其成份包括：1%醋酸泼尼松龙(悬混颗粒)，氯化苄烷铵，聚氧乙烯山梨醇脂肪酸酯80(表面活性剂)，硼酸，柠檬酸钠，亚硫酸氢钠，氯化钠，依地酸二钠，羟丙基甲基纤维素，纯净水。药理毒理本药是一种糖皮质激素，相同剂量下，其抗炎效力是氢化可的松的3-5倍，糖皮质激素可减轻炎症反应时组织水肿，纤维沉积，抑制毛细血管扩张，吞噬细胞游走。同样也可抑制毛细血管的增生，胶原的沉积及疤痕的形成。适应症睑球结膜、角膜及其它眼前段组织的对糖皮质激素敏感的炎症。不良反应继发眼部的真菌和病毒感染在一些角膜及巩膜变薄的患者长期使用，还可导致眼球穿孔。过量使用会引起全身性副作用。用法用量滴眼，每日2-4次，每次1-2滴。开始治疗的24-48小时，剂量可酌情增大至每小时2滴。不宜中途终止治疗，应逐步减量停药。注重事项未行抗感染治疗的急性化脓性眼部感染，急性单纯疱疹病毒性角膜炎，牛痘、水痘感染性疾病，角膜及结膜的病毒感染，眼结核，眼部真菌感染

。对该药成份过敏者禁用。长期或大剂量眼部使用皮质类固醇激素可导致后囊膜下白内障。有单纯疱疹病毒性角膜炎病史患者、急性化脓性感染患者、孕妇慎用。可引起眼内压升高，从而导致视神经的损害和视野的缺损，因此建议使用该药期间应常测眼内压。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com