

醋酸泼尼松龙软膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E9\\_86\\_8B\\_E9\\_85\\_B8\\_E6\\_B3\\_BC\\_E5\\_c22\\_314433.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E9_86_8B_E9_85_B8_E6_B3_BC_E5_c22_314433.htm)

药品名称醋酸泼尼松龙软膏 英文名称Prednisolone Acetate Ointment 类别皮肤科用药制剂本品为乳剂型基质的白色软膏。4g：0.02g、10g：0.05g  
分子式成分化学名为：11 $\beta$ ，17 $\beta$ ，21-三羟基孕甾-1，4-二烯-3，20-二酮-21-醋酸酯。分子式：C<sub>23</sub>H<sub>30</sub>O<sub>6</sub>。分子量

：402.49药理毒理本品为肾上腺皮质激素类药物。外用具有：  
(1)抗炎、抗过敏、抗增生、止痒及减少渗出作用；(2)可以减轻和防止组织对炎症的反应，能消除局部非感染性炎症引起的发热、发红及肿胀，从而减轻炎症的表现；(3)免疫抑制作用：防止或抑制细胞中介的免疫反应，延迟性的过敏反应，并减轻原发免疫反应的扩展。药动学本品的软膏剂可经皮肤吸收，尤其在皮肤破损处吸收更快。本品无需经肝脏代谢即可发挥作用。适应症过敏性、非感染性皮肤病和一些增生性皮肤病疾患。如皮炎、湿疹、神经性皮炎、脂溢性皮炎及瘙痒症等。不良反应长期使用可引起局部皮肤萎缩，毛细血管扩张、色素沉着、毛囊炎、口周皮炎以及继发感染。用法用量外用：一日2-4次，涂于患处，并轻揉片刻  
注意事项禁用于感染性皮肤病，如脓疱病、体癣、股癣等。对本品过敏者禁用。不宜长期使用，并避免全身大面积使用。用药一周后症状未缓解，应向医师咨询。涂布部位如有灼烧感、瘙痒、红肿等，应停止用药，洗净。必要时向医师咨询。当药品性状发生改变时，禁止使用。#093.孕妇需慎用。#093.儿童需慎用。  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

