

短小棒状杆菌菌苗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9F\\_AD\\_E5\\_B0\\_8F\\_E6\\_A3\\_92\\_E7\\_c22\\_314457.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E7_9F_AD_E5_B0_8F_E6_A3_92_E7_c22_314457.htm) 药品名称短小棒状杆菌菌苗 药物别名短棒菌苗，丙酸杆菌，可化舒

，*Propionibacterium acnes*，COPARVAX 类别生物反应调节剂  
制剂注射液：每支5ml（含死菌35mg）；1ml，（含死菌7mg）。菌苗中均含甲醛（防腐）。粉针剂：7mg。药理及应用为短小棒状杆菌（*Corynbacterium par um*）的死菌悬液，也是一种强的非特异性免疫增强剂。它的作用机理尚不太清楚，可能主要通过激活巨噬细胞，使其吞噬活性加强，亦有认为系刺激B细胞增生，促进高效价IgM、IgG抗体的合成。临床试用于恶性黑色素瘤、乳腺癌及肺的小细胞型未分化癌。腹腔注射对癌性腹水也有治疗作用。贮存低温4℃以下保存。  
用法用量（1）皮内注射：最好注射在淋巴结引流区内，每点0.5mg，共8点，后可增加到12点，两点相距1~2cm，每周1~2次。（2）皮下注射或肌注：一般选择上臂三角肌处注射，每次3.5~4mg。注射前加等量的2%利多卡因以减轻疼痛。每周注射2次。（3）静滴：常用4~10mg，加于250~500ml生理盐水或5%葡萄糖液中1~4小时内滴完。（4）一般以2~4周为一疗程，如有效可较长时期应用。注重事项（1）副作用有寒战发热。氨基转移酶升高、血压波动等。（2）病人寒战时可给热饮料；体温高于39℃以上时可给解热剂或物理降温。必要时给予输液或其他支持治疗。在静滴本品前可给予氢化可的松100mg，以减轻副反应。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)