

复方乳酸钠葡萄糖注射液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_A4_8D_E6_96_B9_E4_B9_B3_E9_c22_314476.htm 药品名称复方乳酸钠葡萄糖注射液 英文名称Sodium Lactate Glucose Injection 类别葡萄糖及其他制剂注射液：1000ml，含乳酸钠3.1g、氯化钠6.0g、氯化钙0.2g、葡萄糖50.0g。分子式成分乳酸钠、氯化钠、氯化钾、氯化钙(CaCl₂·2H₂O)、无水葡萄糖。药理毒理通过调节体液容量、渗透压、补充钾、钠、钙及氯离子并供给热量。其中乳酸钠在体内转化为碳酸氢离子，以调节酸碱平衡，维持正常生理功能；钠是细胞外液最重要的阳离子，系维持恒定的体液渗透压和细胞外容量的主要物质；钾是细胞内主要的阳离子，对保持正常的神经肌肉兴奋性有重要作用；钙离子在细胞内作为第二信使与机体许多功能密切相关。葡萄糖供给热量。乳酸离子可纠正代谢性酸中毒，使钾离子自血及细胞外液进入细胞内。当体内循环血液量及组织液减少时，本品可作为组织液的补充调整剂，对电解质紊乱及酸中毒有纠正作用。适应症代谢性酸中毒、失血、手术时出血、失水症及电解质紊乱。不良反应快速大量给药时，可能出现水钠潴留，引起水肿、血压升高、心率加快、胸闷、呼吸困难、甚至急性左心衰竭。相互作用与其他药物合用时，注重药物（如大环内酯类抗生素、生物碱、磺胺类）因pH及离子强度变化而产生配伍禁忌。由于本品含有钙离子，与含有枸橼酸钠的血液混合时会产生沉淀。与含磷酸离子及碳酸离子混合时可能产生沉淀。用法用量静脉滴注：一次500ml~1000ml。给药速度按年龄、体重、症状适当增减。每小

时0.5g/kg。注重事项心、肾功能不全、重症肝功能障碍、糖尿病、乳酸血症患者慎用。乳酸血症患者及高钾血症、少尿、阿狄森氏病、重症烧伤、高氮血症患者及糖尿病患者禁用。下列情况慎用： 水肿性疾病如肾病综合征、肝硬化腹水、充血性心率衰竭、急性左心衰竭、脑水肿及特发性水肿； 急性肾功能衰竭少尿，慢性肾功能衰竭尿量减少而对利尿剂反应不佳者； 高血压。（2）用药时根据临床需要可作下列检查及观察： 血气分析或血二氧化碳结合力检查。血清钠、钾、钙、氯浓度测定。 肾功能测定，包括血尿素氮、肌酐等。 血压。 心肺功能状态，如浮肿、气急、紫绀、肺部罗音、颈静脉充盈，肝-颈静脉返流等，按需作静脉压或中心静脉压测定。 肝功能不全表现如黄疸、神志改变、腹水等。应严格按照需要用药，防止体液形成新的不平衡。注重给药速度不能过快。#093.孕妇有妊娠高血压综合征者可能加剧水肿、增高血压。#093.按年龄、体重及病情计算用量。#093.老年患者常有隐匿性心肾功能不全，应慎用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com