

乙碘油 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B9\\_99\\_E7\\_A2\\_98\\_E6\\_B2\\_B9\\_c22\\_314503.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E4_B9_99_E7_A2_98_E6_B2_B9_c22_314503.htm) 药品名称乙碘油 药物别名Iodised Oil 英文名称Ethiodized Oil 类别造影剂制剂注射液：5ml(36%)、10ml(36%)。药动学口服T<sub>1/2</sub>为1.6个月，肌注则为5.7个月。注入支气管内的碘化油，在3h~4h内60%~80%从气管咳出，在24h~48h内基本排完。注入子宫、输卵管内的碘化油大部分从阴道排出，小部分进入腹腔缓慢吸收、消除 适应症淋巴管、输卵管及窦道造影。由于本品油质太薄，不宜用于支气管造影。不良反应大量吞入碘化油可引起碘中毒，症状有厌食、恶心、呕吐、唾液腺肿胀、流涎、口内铜臭味、喉部烧灼感、咳嗽、气急、胸闷、眼炎、鼻窦炎、皮疹等。可引起肉芽肿。并可促使肺结核病灶恶化。用法用量淋巴管造影：单侧不超过15ml，双侧同时注射总量不超过25ml，注射速度要慢。 注重事项有碘过敏史者慎用。应做相应的碘过敏试验。甲状腺机能亢进、甲状腺肿瘤、有严重心、肝、肺疾患、急性支气管炎和发热患者禁用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)