

丙酸倍氯米松软膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E4_B8_99_E9_85_B8_E5_80_8D_E6_c22_314520.htm

药品名称丙酸倍氯米松软膏
药物别名Dipropionate 英文名称Beclomethasone#093. 类别皮肤科用药制剂霜剂：0.025%。本品为乳剂型基质的白色软膏
分子式成分化学名称为：16 - 甲基 - 11 , 17 , 21 - 三羟基 - 9 - 氯孕甾 - 1 , 4 - 二烯 - 3 , 20 - 二酮 - 17 , 21 - 二丙酸酯。分子式：C₂₈H₃₇ClO₇。分子量：521.05
药理毒理本品为强效外用肾上腺皮质激素类药。本品外用具有：1. 抗炎、抗过敏、止痒和减少渗出作用。2. 可以减轻和防止组织对炎症的反应，能消除局部非感染性炎症引起的发热、发红及肿胀，从而减轻炎症的表现。3. 免疫抑制作用：防止或抑制细胞中介的免疫反应，延迟性的过敏反应，并减轻原发免疫反应的扩展。
药动学本品可经皮肤吸收，尤其在皮肤破损处吸收更快，大面积使用于皮肤破损或长期用封包性敷料可因吸收引起全身反应。本品亲酯性强，易渗透，涂于患处30分钟后即生效，软膏剂的T_{1/2}约为3小时。钠潴留及糖原沉着作用很弱，也无雄性、雌性及蛋白同化激素样的作用，对体暖和尿也无明显影响。适应症湿疹、各种皮炎、银屑病等。过敏性与炎症性皮肤病和相关疾病，如湿疹、过敏性皮炎、接触性皮炎、神经性皮炎、扁平苔藓、盘状红斑狼疮、掌跖脓疱病、瘙痒、银屑病等。不良反应长期或大面积应用，可引起皮肤萎缩及毛细血管扩张，发生痤疮和毛囊炎，偶致接触性皮炎。易引起红斑、灼热、丘疹、痂皮等。用法用量外用涂于患处，2~3次/日。必要时予以封包。注重事项对

并发细菌感染的皮肤病，应与相应的抗生素配用；真菌性或病毒性皮肤病禁用。本品不宜长期大面积应用，亦不宜采用封包治疗，大面积使用不能超过2周。治疗顽固、斑块状银屑病。若用药面积仅占体表面积5%~10%可连续应用4周，每周用量均不能超过50g。伴有皮肤感染，必须同时使用抗感染药物。不可用于眼部。用药一周后症状未缓解，应向医师咨询。药品性状发生改变时，禁止使用。#093.孕妇应慎用，避免长期大量用药。#093.婴儿应慎用，避免长期大量封包给药。#093.避免长期大量封包给药。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com