

卡介菌多糖核酸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_8D_A1_E4_BB_8B_E8_8F_8C_E5_c22_314534.htm 药品名称卡介菌多糖核酸药物别名卡舒宁、卡提素、唯尔本、卡介苗多糖核酸、斯奇康 英文名称BCG-Polysaccharide Nucleic Acid 类别生物反应调节剂制剂注射液：0.5mg。分子式成分含核酸14.663%、水分10.005%、钙0.782%、无机磷0.270%、多糖61.145%、蛋白0.005%、钾0.558%。药理毒理本品系用卡介菌经热酚法提取多糖、核酸，配以灭菌生理盐水的卡介菌多糖核酸注射液。本品作为一种新型免疫调节剂，主要作用是调节机体免疫水平，增强机体的抗感染和抗过敏能力。适应症慢性支气管炎、哮喘、感冒、慢性感染(如慢性肾炎)、过敏类疾病(如荨麻疹、过敏性皮炎)、免疫复合物疾病(如肾小球肾炎)、系统性红斑狼疮、风湿性关节炎、免疫功能缺陷、肿瘤、神经性皮炎、尖锐湿疣等。不良反应偶见红肿、结节，热敷后一周内自然消退。用法用量每次0.5mg，一周3次，3个月为一疗程。或遵医嘱。注重事项患急性传染病（如麻疹、百日咳、肺炎等）、急性眼结膜炎、急性中耳炎及对本品过敏史者暂不宜使用。本品不应有摇不散的凝块及异物，安瓿有裂纹或有异物者不可使用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com