

倍他米松软膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E5\\_80\\_8D\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_80_8D_)

[E4\\_BB\\_96\\_E7\\_B1\\_B3\\_E6\\_c22\\_314584.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_80_8D_E4_BB_96_E7_B1_B3_E6_c22_314584.htm) 药品名称倍他米松软膏 英文名称Betamethasone Ointment 类别皮肤科用药制剂软膏

为乳剂型基质的白色软膏4g：4mg、10g：10mg。分子式成分化学名称为：16 $\beta$ -甲基-11 $\beta$ ，17 $\beta$ ，21-三羟基-9 $\alpha$ -孕甾-1，4-二烯-3，20-二酮。分子式为：C<sub>22</sub>H<sub>29</sub>FO<sub>5</sub>。分子量

：392.47 药理毒理倍他米松软膏为肾上腺皮质激素类药物。

外用具有：(1)抗炎、抗过敏、止痒及减少渗出作用；(2)可以减轻和防止组织对炎症的反应，能消除局部非感染性炎症引起的发热、发红及肿胀，从而减轻炎症的表现；(3)免疫抑制作用：防止或抑制细胞中介的免疫反应，延迟性的过敏反应，并减轻原发免疫反应的扩展。药动学本品的软膏剂可经皮肤吸收，尤其在皮肤破损处吸收更快。适应症过敏性皮炎、湿疹、神经性皮炎、脂溢性皮炎及瘙痒症等。不良反应长期使用可引起局部皮肤萎缩，毛细血管扩张、色素沉着、毛囊炎、口周皮炎以及继发感染。用法用量外用：一日2-4次，涂于患处，并轻揉片刻。注重事项禁用于感染性皮肤病，如脓疱病、体癣、股癣等。对本品过敏者禁用。不宜长期使用，并避免全身大面积使用。用药一周后症状未缓解，应向医师咨询。涂布部位如有灼烧感、瘙痒、红肿等，应停止用药，洗净。必要时向医师咨询。当药品性状发生改变时，禁止使用。#093.孕妇需慎用。#093.儿童需慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)