

安达美 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_AE_89_E8_BE_BE_E7_BE_8E_c22_314598.htm 药品名称安达美 英文名称addamel 类别肠道外营养用药制剂注射液：每支10ml。药理及应用一般饮食摄入不会引起微量元素的缺乏和过量，但长期肠外营养，可造成微量元素摄入不足，故本品仅用于15kg以上儿童及成人长期肠外全营养时补充电解质和微量元素。说明本品为含电解质和微量元素的淡黄色无菌浓缩液，在成人肠外营养中应用以满足对微量元素的基本需要。本品每ml含氯化钙73.5mg，氯化铁1.35mg，氯化锰0.79mg，氟化钠0.21mg，氯化镁30.42mg，氯化锌0.27mg，氯化铜85 μg，碘化钾17 μg，山梨醇0.3g，以氢氧化钠调至ph2.5。10ml（1安瓿）安达美注射液中，含电解质和微量元素为：钙5mmol，铁50 μmol，锰40 μmol，镁1.5mmol，锌20 μmol，铜5 μmol，氟50 μmol，碘1 μmol，氯13.3mmol。用法用量10ml（1安瓿）本品应加入500~1000ml的凡命氨基酸注射液或葡萄糖注射液内。混合液的输注时间为6~8小时。本品能为病人提供钙、镁、铁、锌、铜、氟、碘和氯的每日正常需要量。由于病人对钠和钾需求不同，故本品不含这两种电解质。注重事项（1）本品用量范围窄，过量摄入有害。（2）必须稀释后应用，在输注前1小时将本品加入稀释液中，输注时间不超过12小时，以免发生污染。不可添加其它药物，以免生成沉淀。（3）肾功能不良及不耐果糖患者忌用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com