

碘海醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E7_A2_98_E6_B5_B7_E9_86_87_c22_314621.htm 药品名称碘海醇药物别名碘苯六醇、欧乃派克 Omnipaque 英文名称Iohexol 类别造影剂制剂欧乃派克180：15ml(含碘180mg/ml)；欧乃派克240：20ml(含碘240mg/ml)；欧乃派克300：100ml(含碘300mg/ml)；欧乃派克350：100ml(含碘350mg/ml)。药动学口服不吸收。静注后分布容积接近于细胞外液，可通过病态的血脑屏障。主要以原形经肾排泄，血管给药后24h内即可排出。鞘内注射后，在脑脊液的T_{1/2}为45min。适应症脊髓造影、尿路造影，也用于血管造影及CT增强扫描。不良反应可见发热、虚脱、耳鸣、麻痹、癫痫、蛛网膜炎、脑膜炎症状等。用法用量以碘计。(1)脊髓造影：腰及胸段椎管造影，腰椎穿刺，1.8g~2.8g/次；颈段椎管造影，腰椎穿刺给药，2.1g~3g/次；颈侧面穿刺给药，1.8g~2.4g/次；CT脑池造影，0.9g~2.8g/次；儿童椎管造影，gt.6岁，1g~2.1g/次。(2)尿路造影：静注，成人12g~24g，儿童0.48g~0.96g/kg，不应超过9.6g/次。(3)动脉造影：3g~12g/次。(4)下肢静脉造影：4.8g~24g/次。(5)心血管造影：9g~18g/次；冠状动脉造影用量2.8g/次。(6)数字减影血管造影(DSA)：动脉内给药，0.18g~4.5g/次；静脉内给药，6g~18g/次。(7)CT增强扫描：快速静注，15g~45g/次；静滴，18g~36g/次。(8)子宫输卵管造影：3.6g~7.5g/次。(9)关节造影：1.2g~4.5g/次。注重事项对碘过敏者忌用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com