

支链氨基酸3h注射液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E6_94_AF_E9_93_BE_E6_B0_A8_E5_c22_314647.htm 药品名称支链氨基酸3h注射液 类别肠道外营养用药制剂注射液：每瓶250ml。药理及应用系支链氨基酸组成，是唯一主要在肝外组织代谢的必需氨基酸。它具有下列重要功能： 代谢生成丙氨酸及酮体，为机体提供能源； 促进胰岛素的分泌； 胆固醇合成的前体； 供给合成蛋白质的必需氨基酸原料； 促进蛋白质的合成； 抑制蛋白质的分解。用于： 急性、亚急性、慢性重症肝炎以及肝硬化、慢性活动性肝炎等； 各种原因引起的肝性脑病（肝昏迷）； 肝胆外科手术前、后患者。贮存置冷暗处保存，防止冻结。说明由单一的3种支链氨基酸组成的无色或几乎无色的澄明水溶液。每100ml中内含卜异亮氨酸1.35g；l-亮氨酸1.65g；l-缬氨酸1.26g。本品的ph为5.5~7.5，渗透压为382mosm / l。用法用量静滴：1日250~500ml，或用5%~10%葡萄糖注射液适量混合后，缓慢静滴，每分钟不超过40滴。一般昏迷期可酌加量，疗程根据病情遵医嘱。注重事项（1）使用前应检查药液，如有浑浊，包装破裂等切勿使用。输注后的剩余药液切勿保存再用。（2）高度食管静脉曲张时，要注重输注速度和用量，以免静脉压增高。（3）高度腹水、胸水时，应注重水的平衡，避免输入量过多。（4）输注过快时，可引起恶心、呕吐等反应，故输注速度宜慢。（5）遇冷易析出结晶，可微温溶解后再使用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com