

甲泛葡胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E7_94_B2_E6_B3_9B_E8_91_A1_E8_c22_314653.htm 药品名称甲泛葡胺药物别名室椎影，AMIPAQUE 英文名称Metrizamide 类别造影剂 性状为白色结晶，易溶于水。溶液不稳定，故其注射液应临用时新配。制剂注射用室椎影：3.75g（冷冻干结晶），另附0.005%碳酸氢钠注射液20ml。药理及应用为新型水溶性三碘环造影剂，属非离子型。特点为渗透压低，且无钠离子影响。其36%溶液（含碘约17%）与脑脊液等渗；60%溶液（含碘28%）的渗透压约为脑脊液的1.6倍，约为同浓度泛影葡胺的1/3。本品在神经系统如脑室、脊椎造影等方面，较甲碘磺酸钠、异泛影、碘卡明等制剂更为安全。与碘苯酯等油剂比较，本品吸收排泄均快，无再行抽出之必要，并可避免抽搐或后遗蛛网膜炎及粘连等。粘度也比同浓度之碘卡明低。本品是水溶性脑室。椎管造影剂中可用于颈椎及胸椎的药物。适用于神经根鞘、椎管、脑池、脑室等；也可用于电子计算机体层摄影。其它部位造影也适用。其优点是当大量快速推注时，耐受性较好，可用于危急病人。用法用量常用36%注射液（含碘17%）10ml，或用60%注射液（含碘28%）5~6ml，成人一次最高用量不得超过6.3g（相当于碘300mg）为度。使用时必须由有经验的医师进行。椎管造影时，应通过腰椎穿刺，放出脑脊液5ml与60%药液混合后注入。注入药液时，应移动病人体位，使药液到达造影部位。注重事项对碘过敏的病人忌用，并忌与其它药液配伍。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com