

碘化油〔典〕〔基〕 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022_E7_A2_98_E5_8C_96_E6_B2_B9_E3_c22_314654.htm 药品名称碘化油〔典〕〔基〕 英文名称iodinated oil 类别造影剂制剂油注射液：每支10ml，含碘40%。胶丸剂：每丸0.1g；0.2g。药理及应用主要用于支气管及子宫、输卵管、瘘管等的造影检查，亦用于地方性甲状腺肿。我国现用以防治地方性甲状腺肿的碘化油是碘化核桃油或碘化豆油，含碘量37.0%～42.0%。肌内注射1次后，碘化油贮存于人体网状内皮系统和脂肪组织，缓慢释放，其疗效维持时间可达2～3年。用药后，患者碘代谢的参数均恢复正常，甲状腺肿逐渐消退，其有效率随时间的延长而增加。用药2年后，地方性甲状腺肿的治愈率为59.8%～70.1%。对那些不能或不易实行碘盐供给的偏远地区尤为适用。此外，应用本品尚可有效地控制地方性克汀病的发生。在妇女怀孕前即给予碘化油，可保证母体在整个妊娠期间乃至哺乳期间都有足够的碘补充，从而有效地预防克汀病。用法用量造影检查：导管直接导入。预防地方甲状腺肿：多用肌注，亦可口服（应用其胶丸剂）。肌注：学龄前儿童1次剂量0.5ml，学龄期儿童或成人1次量1ml，每2～3年注射1次；口服，学龄前儿童每次服0.2～0.3g，学龄期至成人服0.4～0.6g，每1～2年服1次。注意事项（1）碘化油注射液较粘稠，注射时需选用较粗大的针头。要注重被注射者有无碘制剂过敏史。（2）碘遇高热和日光照射易游离析出，故本品不宜在日光下或空气中暴露过久。（3）甲状腺机能亢进、老年结节型甲状腺肿、甲状腺癌患者及有发热、过敏体质或有心、肝

、肺疾患者，禁止使用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com