

木糖醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E6_9C_A8_E7_B3_96_E9_86_87_c22_314669.htm

药品名称木糖醇 英文名称xylitol 类别肠道外营养用药性状白色结晶粉末，无臭，有似蔗糖甜味，易溶于水。4.65%水溶液与血液等渗。制剂口服粉剂：每包500g。注射液：每瓶25g（500ml）；50g（500ml）。

药理及应用为营养药，能补充热量，改善糖代谢。在体内代谢不依靠胰岛素的参与，直接透过细胞膜参与糖代谢而不增加血糖浓度，其甜味及产热量与葡萄糖相仿，可用于糖尿病患者作为糖的代用品。此外，尚有抑制酮体生成的作用，能使血浆脂肪酸生成减少，可用作糖尿病、手术麻醉时酮中毒的合并用药。用法用量口服：1日25~50g，分3~4次服用，调于饮食中服用更佳。静脉注射：1次25~30g。注重事项（1）口服偶可引起肠鸣、腹泻，减少用量可减轻其副作用。

（2）静注浓度过高，速度过快，可致代谢性酸中毒，引起肾脏、大脑功能损伤。（3）胰岛素诱发的低血糖症禁用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com