

补骨脂素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E8_A1_A5_E9_AA_A8_E8_84_82_E7_c22_314697.htm

药品名称补骨脂素
英文名称Psoralen 类别皮肤科用药制剂注射液（油溶液）：每支2ml含药1mg。外用溶液：每瓶50ml含药25mg。胶囊剂：每粒含药40mg。分子式成分药理及应用有增加皮肤黑色素的作用，适用于白癜风。此外，尚可用于斑秃及牛皮癣。用法用量（1）治白癜风：每次2ml，肌注，1日1次，可连用数月。注射后1小时左右到室外，使患处晒太阳10~30分钟，或用紫外线灯照射，灯距50cm，从1~2分钟开始，每次或隔日增加1分钟，渐增加至每次10~15分钟。或外用溶液涂搽。将药水涂患处（先从小面积开始），数分钟后到室外晒太阳，从5分钟开始，如无过敏反应，可逐渐增加至每次晒20分钟。有条件的可局部用紫外线灯照射（照射法同针剂）。每2~3日上药1次，坚持数月或半年以上。大面积患者可同时用针剂。面、手等露出部位在晒太阳后可将药液洗去。（2）治牛皮癣：口服每次40~80mg（体重轻者剂量小），2小时后全身照黑光。一般照距在7~17cm时，照光时间为15~30分钟。对皮损顽固部位，照距要缩短。如此每日或隔日治疗1次，每周3~6次。基本治愈后，继续作巩固治疗，逐步延长间隔时间。注重事项（1）对日光过敏者忌用。（2）如局部晒太阳或照紫外线后有红肿、起水泡者，应暂停用，待恢复后再用，但照紫外线或晒太阳的时间应缩短。（3）注射液如有结晶析出，可置沸水中加热10分钟左右，待结晶溶解并冷后再用。加热时出现混浊现象，系增溶剂所致，冷后即变为澄明。（4）避光防冻保存。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接

下载。详细请访问 www.100test.com