

蜂胶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E8_9C_82_E8_83_B6_c22_314706.htm 药品名称蜂胶 英文名称propolis 类别皮肤科用药性状黄褐色或灰褐色有时带青绿色彩的粘性物，有芳香气味，味苦，低温下变硬脆，65℃ 熔化，比重1.127。制剂片剂：每片0.3g。乙醇溶液：5%~30%。软膏：5%~30%。分子式成分从蜂箱里收集的蜂胶约含树脂和树香55%、蜂蜡30%、挥发油10%、花粉夹杂物5%。从蜂胶中已分离出20余种黄酮化合物（如刺槐素、芹菜素、高良姜素、山萘酚、鼠李素、异鼠李素、槲皮素等）以及苯甲酸、栓皮酸、香英兰酸、维生素b1、维生素a、烟酸等。用法用量（1）治牛皮癣：每次服0.6~0.9g，1日3次。1疗程2~3个月。一般在服药后2~4周开始见效。（2）治高脂血症：每次服1.5g，1日3次。疗程1月。（3）治胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎；将10%蜂胶乙醇溶液15~20滴混于温开水中服下，1日3次，连用18~20日。（4）外用： 皮肤科：多采用5%~20%蜂胶酊剂（或乙醇溶液）、20%~30%蜂胶软膏或不同浓度的蜂胶洗剂，每日或隔日涂敷，疗程可视疗效而定，一般用药2周左右，多者1~3月。治鸡眼可用新鲜蜂胶贴患处，1周左右鸡眼即可自行脱落。 外科：局部用酊剂、软膏。烧伤宜用15%蜂胶软膏，浓度过高有刺激性，低于此浓度疗效差。5%蜂胶乙醇溶液局部喷雾治疗下肢溃疡，疗程视疗效而定。 妇科：与外科类似，阴道内或宫颈局部用药浓度不可过高，一般采用5%~20%左右浓度。 五官科：治急性、化脓性中耳炎，鼻炎、慢性咽炎及喉炎，口腔粘膜溃疡，感染性口炎，牙周病等，可将30%蜂胶乙醇溶液与甘油（或杏仁油

) 按1：2比例混合后涂患处，每日1次，连用10～15日。注重事项口服蜂胶制剂后，个别病人有口鼻发干、头晕、嗜睡、食欲减少、胃部不适等，一般不影响继续用药。局部应用可引起过敏反应，症状包括瘙痒、发红、湿疹，有时见鼻痒、咽喉痛、头痛、体温降低、接触性皮炎等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com