

盐酸芬氟拉明 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E8_8A_AC_E6_c22_314726.htm 药品名称盐酸芬氟拉明
药物别名氟苯丙胺 Pondimin；Obedrex；Pomleral

；Pondcrax；Fenfluramine 英文名称Fenfluramine Hydrochloride
类别减肥药制剂片剂：10mg。药理毒理为苯丙胺类食欲抑制剂。但中枢兴奋作用很小，并有较大的安定作用，可使血压下降；亦能增加四周组织对葡萄糖的利用而降低血糖，还有降低甘油三酯、胆固醇、总血浆脂质的作用。因此，除用于单纯性肥胖症外，可用于患有高血压、糖尿病、冠心病及焦虑的肥胖病人。服药后患者均能适应饮食控制，有明显减少脂肪积聚的效果，一般服药12周后平均腹围减少10cm，平均体重减轻6kg左右。口服吸收良好，经24小时血浓度达峰值，作用维持68小时， $t_1/2$ 约20小时，服药34天后血药水平可达稳定状态，并产生疗效。大部分以代谢物形式从尿中缓慢排泄。药动学口服后 T_{max} 约1~2h， $T_{1/2}$ 约8~20h。适应症肥胖症，其作用是促成饱感。不良反应常见口干、呕吐、腹痛、腹泻等，亦有致幻作用，过量可引起苯丙胺样症状如旋转性眼震、下颌持续振颤。亦可惊厥、昏迷、室颤甚至死亡。长期服用忽然停药可引起精神抑郁。相互作用与氟烷合用可致严重心律失常，手术前一周应停用本品。用法用量口服，成人20mg/次，2~3次/日，餐前服。注重事项妊娠、哺乳期妇女及癫痫、青光眼、服用单胺氧化酶抑制剂者禁用，驾驶员、高空作业者慎用。从小剂量开始可减少不良反应，宜逐渐停药。服用过量，除常规支持疗法外，可给予利尿药、安定等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 www.100test.com