

右苯丙胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_8F_B3_E8_8B_AF_E4_B8_99_E8_c22_314728.htm 药品名称右苯丙胺药物别名Dexamphetamine，Dexamine，Dexamphate 英文名称Dexamfetamine〔 〕类别减肥药性状白色结晶性粉末，无臭，微苦，熔点295~300。易溶于水，难溶于乙醇，不溶于乙醚。制剂片剂：每片2.5mg；5mg；10mg。分子式成分药理及应用为食欲抑制剂。其中枢兴奋作用比苯丙胺强，对心血管的影响则较小，食欲抑制作用约为苯丙胺的2倍，为左旋苯丙胺的3~4倍。作用机制主要是刺激下丘脑饱觉中枢，从而抑制食欲中枢，引起食欲减退。临床用于治疗肥胖症，同时应结合饮食限制和体力活动。也用于发作性睡病、慢性酒精中毒及疲惫等。用法用量口服：1次2~10mg，每日2~3次（饭前半小时服用），最后1次眼药应在就寝前数小时，以免失眠。6~12周为1疗程。极量，1次20mg，1日30mg。注重事项可有失眠、不安、神经过敏、头晕、震颤、血压升高、头痛、心悸、口干、恶心、散瞳等。过敏者慎用；高血压、心血管疾病、甲状腺功能亢进症患者忌用。由于本品能产生欣快感，故易成瘾和产生精神依赖性，不宜长期大量应用。不可同时应用单胺氧化酶抑制剂。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com