

芬氟拉明〔典〕 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8A\\_AC\\_E6\\_B0\\_9F\\_E6\\_8B\\_89\\_E6\\_c22\\_314738.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E8_8A_AC_E6_B0_9F_E6_8B_89_E6_c22_314738.htm) 药品名称芬氟拉明〔典〕 药物别名氟苯丙胺，Obedrex，Ponderal，Ponderax 英文名称Fenfluramine 类别减肥药性状其盐酸盐为白色结晶性粉末，无臭，微苦。熔点169~173。溶于水，易溶于乙醇、氯仿，不溶于乙醚。制剂片剂：每片10mg；20mg。胶囊剂：每胶囊60mg。分子式成分药理及应用为苯丙胺类食欲抑制剂，但中枢兴奋作用很小，并有较大的安定作用，可使血压下降；亦能增加四周组织对葡萄糖的利用而降低血糖，还有降低甘油三酯、胆固醇、总血浆脂质的作用。因此，除用于单纯性肥胖症外，可用于患有高血压、糖尿病、冠心病及焦虑的肥胖病人。服药后患者均能适应饮食控制，有明显减少脂肪积聚的效果，一般服药12周后平均腹围减少10cm，平均体重减轻6kg左右。口服吸收良好，经2~4小时血浓度达峰值，作用维持6~8小时， $t_{1/2}$ 18~20小时，服药3~4天后血药水平可达稳定状态，并产生疗效。大部分以代谢物形式从尿中缓慢排泄。相互作用对肥胖伴有高血压和糖尿病患者，如合并使用降压药或降糖药，可产生协同作用。用法用量口服：第1周每日40mg，早、晚餐前0.5~1小时服用；第2、3周每日30~60mg，早、中、晚餐前0.5~1小时服；以后根据疗效与耐受程度可继续维持原量或逐渐增至每日80~100mg（每日100mg限于较重的肥胖者），8~12周为一疗程。长效胶囊剂：每日1次60mg（饭前2小时内服用）；必要时可在开始3~4周内天天1次120mg。注重事项（1）治疗期间不要间歇性

服药，疗程最后4或6周内逐渐减量而至停药，不宜忽然停药。连续服药时间不应超过6个月，否则易发生耐药性及依靠心理。（2）副作用主要有非腹泻性大便次数增多、轻度腹痛、头晕、乏力、口干等，但一般均能耐受，持续用药可逐渐消除。尚可有嗜睡、抑郁及夜尿增多。不能耐受者应减量。（3）精神抑郁症、癫痫患者及孕妇忌用。严重心律失常、高空作业者及驾驶员慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)