

英特利匹特 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E8_8B_B1_E7_89_B9_E5_88_A9_E5_c22_314739.htm 药品名称英特利匹特
英文名称Intralipid 类别肠道外营养用药制剂注射乳剂：每
瓶10g（100ml）；15g（100ml）；20g（100ml）；25g（250ml）；37.5g（250ml）；50g（250ml）。药理及应用为一种静脉应用的营养药，提供营养所需的热量和必需脂肪酸，如10%乳剂含1100千卡/L，20%乳剂含2000卡/L，且无氨基酸和糖类溶液高渗压的缺点。适用于需要高热量的患者（如肿瘤及其它恶性病）、肾损害、禁用蛋白质的病人和由于某种原因不能经胃肠道摄取营养的患者，以补充适当热量和必需脂肪酸。说明系由大豆油加入一定量卵磷脂乳化而成的无菌、无热原的脂肪乳剂，并含2.5%的甘油。用法用量静滴：第一日脂肪量不应超过1g/kg，以后剂量可酌增，但脂肪量不得超过2.5g/kg。静滴速度最初10分钟为20滴/分，如无副作用出现，以后可逐渐增加，30分钟后维持40~60滴/分。注重事项（1）长期使用应注重脂肪排泄量及肝功能，每周应作血象、血凝、血沉、血小板计数等检验。如血浆有乳光或乳色出现，应推迟或停止应用。（2）严重急性肝损害及严重代谢紊乱非凡是脂肪代谢紊乱（脂质肾病，严重高脂血症）患者禁用。（3）使用本品时不可将电解质溶液直接加入脂肪乳剂，以防乳剂破坏而使凝聚脂肪进入血液。（4）使用前应先检查是否有变色或沉淀。启封后应一次用完。（5）置于4~8℃保存，过高或过低温度均导致乳剂破坏。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com