

盐酸金霉素眼膏 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_90\\_E9\\_85\\_B8\\_E9\\_87\\_91\\_E9\\_c22\\_314761.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E9_87_91_E9_c22_314761.htm) 药品名称盐酸金霉素眼膏

药物别名氯四环素 Aureomycin 英文名称Chlortetracyclin Hydrochloride Eye Ointmen 类别眼科用药制剂眼膏剂：5%

。0.5%(g/g) 分子式成分化学名为6-甲基-4-(二甲氨基)-3,6,10,12,12a,-五羟基-1,11-二氧化-7-氯-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-八氢-2-并四苯甲酰胺盐酸盐。分子式

: C<sub>22</sub>H<sub>23</sub>ClN<sub>2</sub>O<sub>8</sub>HCl。分子量：515.35。药理毒理本品为四环素类抗生素，许多立克次体属、支原体属、衣原体属、非典型分枝杆菌属、螺旋体对本品敏感。肠球菌属对其耐药。多年来由于四环素类的广泛应用，临床常见病原菌对金霉素耐药现象严重，葡萄球菌等革兰阳性菌及多数肠杆菌科细菌耐药。本品与四环素类不同品种之间存在交叉耐药。本品作用机制为药物能特异性与细菌核糖体30S亚基的A位置结合，抑制肽链的增长和影响细菌蛋白质的合成。药动学本品为局部用药，很少吸收。适应症急性沙眼、结膜炎、角膜炎等。不良反应少见，应用本品后可感到视力模糊。应用时耐药菌株可过度生长。用法用量涂于眼睑内，一日3次。注意事项有四环素类药物过敏史者禁用。急性或慢性沙眼的疗程应为1~2月或更长，眼膏可作为夜间治疗用药，以保持感染部位与药物接触较长时间。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)