

力能 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_8A_9B_E8_83_BD_c22_314791.htm 药品名称力能 英文名称Lipovnoes

类别肠道外营养用药制剂玻璃瓶，100ml/瓶，250ml/瓶

，500ml/瓶 分子式成分精制豆油、中链甘油三酯(MCT)、甘油、卵磷脂。适应症胃肠外营养。长链甘油三酯(LCT)和可快速转换的中链甘油三酯(MCT)满 不良反应用脂肪乳后可能发生的早期反应是体温轻度升高 发热感严寒感 寒战 不正常的热感

感#091.旁路，Y型管)必须保证所有溶液的相容性。不能使用孔径为02uM的过滤器因为脂肪乳不能通过这些过滤器。使用前摇匀[.给予力能MCT可与所需肠外营养的时间一样长。

【过量和其他使用错误】过量(输入脂肪乳时甘油三酯水平超过3mmol/l或270mg / dl)会导致在下一节中提到的副作用。在这些情况下应停止脂肪乳输入，或假如必要，应减低剂量后再输入。假如在输入力能MCT中有显著的反应性血糖升高也应停止输液。严重的力能MCT过量并且没有同时给予碳水化合物，可能导致代谢性酸中素。注重事项严重凝血障碍、休克和虚脱、妊娠，急性血栓栓塞，伴有酸中毒和缺氧的严重脓毒败血症状状态，脂类栓塞，急性心肌梗塞和中风，酮症酸中毒昏迷和糖尿病性前期昏迷禁用。输液过程中出现甘油三酯蓄积时，以下出将禁忌证：脂类代谢障碍，肝功能不全，肾功能不全，网状内皮系统障碍急性出血坏死性胰腺炎。

胃肠外营养的一般禁忌证各种原因引起的酸中毒，未治疗的水电解质代谢紊乱(这里指：低渗脱水低血钾，水份过多)，代谢不稳定，肝内胆汁淤积。目前尚无将力能MCT用于新生儿、婴幼儿或儿童的经验。对大豆或其他蛋白质高度敏感

。胃

肠

外

营

养

的

一

般

的病人慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com