

右芬氟拉明 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8F\\_B3\\_E8\\_8A\\_AC\\_E6\\_B0\\_9F\\_E6\\_c22\\_314818.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_8F_B3_E8_8A_AC_E6_B0_9F_E6_c22_314818.htm) 药品名称右芬氟拉明  
药物别名Isomeride 英文名称Dexfenfluramine〔 〕类别减肥药  
制剂剂型胶囊剂：每胶囊15mg。药理及应用作用同芬氟拉明，但活性较强，服用剂量较小。能选择性抑制葡萄糖的消耗，从而降低总热卡消耗，但不影响蛋白质的摄入。没有精神兴奋作用及升血压作用，亦无成瘾性。口服吸收完全，经4小时血浓度达峰值，消除 $t_{1/2}$ 18小时，代谢物近乎全部从尿中排泄。临床适用于各种肥胖症。相互作用与三环类抗抑郁药、抗高血压药、磺酰脲类降血糖药有协同作用。不可与单胺氧化酶抑制剂同用。说明为芬氟拉明活性右旋体。用法用量口服：1次15mg，每日2次（早、晚进餐时服用），每疗程一般不超过3个月。注重事项主要有口干、恶心、便秘、腹泻、乏力等，但继续用药可消失。心律失常、肝、肾功能不全者慎用。青光眼、孕妇、哺乳期忌用。如有动脉压升高，应停药。  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)