

磷酸钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E7_A3_B7_E9_85_B8_E9_92_A0_c22_314830.htm 药品名称磷酸钠 英文名称Sodium Phosphate 类别器官功能检查及其他诊断剂制剂溶液剂(有载体)：370MBq、740MBq、1850MBq、3700MBq；注射液(无载体)：185MBq、370MBq、925MBq、1850MBq。分子式成分磷[³²P]酸钠适应症真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、慢性粒细胞白血病、慢性淋巴细胞性白血病等以及浅表肿块性质鉴别，也用于神经性皮炎、慢性湿疹、毛细血管瘤、疤痕疙瘩、翼状胬肉、角膜新生血管、浆细胞瘤等的敷贴治疗。用法用量真红细胞增多症：口服，每疗程222MBq～296MBq(6mCi～8mCi)。慢性白血病：静注，每疗程148MBq～185MBq(4mCi～5mCi)。诊断浅表性肿块性质：口服，7.4MBq～11.1MBq(0.2mCi～0.3mCi)。口服后，分别于24h、48h和72h测量肿块处及健侧对应部位放射性，若比值>125%，则恶性病变可能性较大。敷贴治疗：剂量视病变种类及程度而定，通常采用分次照射。注意事项口服宜空腹。服³²P前和后均需低磷饮食一周，并禁服含磷药物。重复治疗至少间隔两个月，其用量应少于首次治疗量。20岁以下、孕妇、授乳妇女、肝和肾功能不全、严重贫血、出血性倾向等患者忌用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com