

妥拉唑林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_A6_A5_E6_8B_89_E5_94_91_E6_c22_314834.htm

药品名称妥拉唑林
物别名苄唑啉、妥拉苏林、苯甲唑啉 Priscoline, Benzoline
英文名称Tolazoline#093. 类别眼科用药制剂注射液：25mg。药理毒理为短效 受体阻断药。对 受体阻断作用与酚妥拉明相似，但较弱，能使四周血管舒张而降压，但降压作用不稳定。能兴奋心肌及增加胃酸分泌。适应症视网膜色素变性、黄斑变性、视网膜中心动脉栓塞、视神经萎缩、玻璃体混浊等，也用于慢性单纯性青光眼早期诊断的激发试验。不良反应有潮红、严寒感、心动过速、恶心、腹上区疼痛、竖立性低血压等。用法用量球后注射：12.5mg ~ 25mg/次，每日或隔日1次，多用于治疗视网膜中心动脉栓塞。皮下或肌肉注射：每次25mg，1 ~ 2次/日。静脉注射：25mg ~ 50mg/次，用以治疗视网膜中心动脉栓塞、视神经萎缩等。结膜下注射：每次10mg，1次/1-2日，作青光眼激发试验时，应于注射后5，15，30，60，90min各测眼压1次，眼压升高9mmHg以上者为阳性。注重事项胃溃疡、心脏病、肾功能不全、已确诊的青光眼患者禁用，糖尿病患者慎用 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com