

马来酸噻吗洛尔滴眼液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E9\\_A9\\_AC\\_E6\\_9D\\_A5\\_E9\\_85\\_B8\\_E5\\_c22\\_314835.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E9_A9_AC_E6_9D_A5_E9_85_B8_E5_c22_314835.htm) 药品名称马来酸噻吗

洛尔滴眼液 类别眼科用药制剂滴眼剂：0.25%或0.5%，每支5ml（其浓度按游离碱计）。药理及应用是马来酸噻吗洛尔无色或淡黄色澄明水溶液。始下降，1~2小时后下降到最大幅度，并可持续24小时。它与常用的缩瞳药不同，在使眼压降低的同时，不缩小瞳孔，也不影响视敏度，不引起睫状肌痉挛，无任何不适感，不会出现明显的视为模糊或夜盲症等。白内障患者由于晶状体四周浑浊，在瞳孔缩小时可能产生视力障碍，使用本品，此种副作用可以避免。由于它具有上述优点，所以被认为是继毛果芸香碱之后，青光眼治疗进展中的最重要药物。其降眼压作用，可能是减少眼内房水生成所致。主要用于原发性开角型青光眼及无晶体青光眼，某些继发性青光眼和高眼压。也可试用于某些对药物或手术治疗后无效的青光眼。用法用量成人用0.25%的眼药水、1次每只眼滴1滴，1日2次。如疗效不佳，可改用0.5%浓度的本品，1次每眼1滴，1日1~2次。如眼压已得到控制，则可改为每日1次维持。如原用其他药物进行治疗时，不宜忽然停用原药，应自改用本品后之第二日起逐渐停用。对病情较重者，更应谨慎。注重事项（1）少数患者有眼干、眼灼热感、眼痛、视力减退、头晕、血压下降、胃肠不适等。个别病人偶可出现心率减慢。（2）有心力衰竭和支气管哮喘的患者慎用。孕妇和儿童最好不用。（3）对本品过敏及心动过缓者禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访

