

硝酸毛果芸香碱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A1\\_9D\\_E9\\_85\\_B8\\_E6\\_AF\\_9B\\_E6\\_c22\\_314839.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E7_A1_9D_E9_85_B8_E6_AF_9B_E6_c22_314839.htm) 药品名称硝酸毛果芸香碱【药物别名】匹鲁卡品，匹罗卡品 Asthenopin 英文名称Pilocarpine Nitrate 类别眼科用药制剂滴眼液：0.5%、1%、4%。 眼用缓释凝胶剂，5.0g：200mg。 药理毒理本品为拟胆碱药，主要作用于M-胆碱受体，直接兴奋受体，对眼部有缩小瞳孔和降低眼压作用，使睫状肌收缩而调节痉挛。 药动学1%的滴眼液滴眼后10min～30min开始缩瞳，降眼压作用的达峰时间约75min，缩瞳持续时间4h～8h以上，降眼压作用与浓度有关，一般维持时间在4h～14h。 适应症开角型青光眼、闭角型青光眼、非色素膜炎性的继发性青光眼、缩瞳等。 降低眼内压 不良反应有视力模糊、近视、结膜炎、虹膜炎、结膜充血、睫状肌充血等。此外，药物吸收引起的全身反应有肌肉震颤、胃肠不适、呼吸困难、哮喘、多汗等。 用法用量慢性青光眼：0.5%～4%溶液1滴/次，4次/日；急性闭角型青光眼：1%～2%溶液1滴/次，每5min～10min点眼1次，3～6次后每1h～3h点1次，直至眼压下降（注重对侧眼角6h～8h点眼1次，以防对侧眼闭角型青光眼的发作）；缩瞳：对抗抗胆碱药的散瞳作用，1%溶液点眼1滴；先天性青光眼术前，用1%溶液，一般点眼1～2次；虹膜切除术前，用2%溶液，1滴/次，共滴4次。 缓释凝胶剂一天1次，每次分别用0.5英寸凝胶于每日晚上睡前涂于眼内。 注重事项支气管哮喘、急性结膜炎或其他不应散瞳的眼病慎用。急性虹膜炎、孕妇及甲亢患者禁用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)