

血活素眼凝胶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E8_A1_80_E6_B4_BB_E7_B4_A0_E7_c22_314847.htm 药品名称血活素眼凝胶
药物别名素高捷疗眼凝胶 英文名称Solcoseryl Eye-Gel 类别
眼科用药制剂眼用胶剂：每支5g(20%)。分子式成分本药是从健康、发育旺盛的小牛血清中提取的不含蛋白质，不含病原体的透析物。内含氨基酸、肽、羧基酸、核酸关连物、多糖和糖脂等有机物，分子量在2500-3000，无机物有钾、钠、钙等，此外尚含有微量未知物。本药除活性成分外，还含有赋形剂-羧甲基纤维素钠，外观呈无色透明的凝胶剂。脱蛋白质的幼牛血液抽取物20%；赋形剂、防腐剂及适量洗眼浓液。

药理毒理素高捷疗是组织细胞呼吸赋活剂，它能在细胞水平促进组织细胞线粒体对氧和葡萄糖的摄取和利用、ATP合成、营养物的运送、新陈代谢及组织再生、修复等一系列依靠能的生物活性，在缺氧、能代谢低下的情况下作用尤其显著。改善低氧状态下的糖代谢，可减少角膜乳酸及丙酮酸蓄积，从而减轻角膜的水合作用，此外，尚能迅速地消除角膜内皮水肿，有利于角膜恢复透明，改善视力，改善角膜的营养，使患眼的角膜内皮、基底膜加速修复。还可促使过度增生的肉芽组织蜕变、胶原纤维重组，减少或避免患处的瘢痕形成，防止泪管口封闭。本药的赋型剂羧甲基纤维素钠的表面活性高，粘度适中，其凝胶液澄明无色，点眼后不影响视力，且能在眼球及眼睑内面形成一层较持久的保护膜，覆盖伤口及溃疡面，既有利于本品在患处发挥作用，又可减轻眨眼时球睑机械摩擦所带来的剧烈疼痛。还可以改善干燥眼患者的泪膜过早破裂，从而缓解干燥眼的症状及继发性损害。适

应症各种原因引起的角膜、结膜的创伤、炎症及溃疡，眼科手术后。不良反应少数患者点眼后有局部灼烧感，国外报告有眼四周皮肤红肿等过敏反应。用法用量点眼，1滴/次，2~4次/日，重症者可增至2h~3h一次，点眼后要闭目2min~3min，以利于更好地发挥药效。疗程一般为3日~2周，重症可延长到3月~6月。注重事项感染性角膜、结膜炎必须针对病原体联合应用有效的抗生素、抗菌药或抗病毒药。非感染性的角膜、结膜疾患则不宜滥用抗病原体的药物，因为长期滥用抗生素、抗菌药或抗病毒药，反而不利于炎症消退且妨碍伤口及溃疡面愈合。严重的角膜、结膜疾患及顽固性溃疡，可适当联合应用肾上腺皮质激素的治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com