

复合氨基酸注射液（18）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_A4_8D_E5_90_88_E6_B0_A8_E5_c22_314898.htm 药品名称复合氨基酸注射液（18）英文名称compound aminoacid injection（18）类别肠道外营养用药制剂注射液：每瓶8.06g（250ml）。药理及应用本品必需氨基酸和非必需氨基酸之比为1.04：1，内含木糖醇能进入无胰岛素的细胞内，具有抑制酮体生成，节省蛋白质，提高氨基酸利用及促进肝糖原蓄积，用于营养不良、低蛋白血症及外科术后的患者。说明系由18种氨基酸组成的无色或微黄色澄明溶液。每100ml内含L-盐酸精氨酸0.289g，L-盐酸组氨酸0.246g，L-亮氨酸0.379g，L-异亮氨酸0.17g，L-盐酸赖氨酸0.333g，L-苯丙氨酸0.283g，L-苏氨酸0.197g，L-缬氨酸0.136g，L-蛋氨酸0.106g，L-色氨酸0.039g，甘氨酸0.324g，L-丙氨酸0.188g，L-脯氨酸0.1g，L-酪氨酸0.011g，L-丝氨酸0.067g，L-盐酸半胱氨酸0.044g，L-天冬氨酸0.115g，L-谷氨酸0.197g，木糖醇5g。用法用量（1）营养不良、低蛋白血症：1次缓慢静滴500ml。（2）外科术后：1次缓慢静滴1500ml。按30～40滴/分滴入。年老或重症患者根据症状、年龄调整剂量及减慢滴速，每日输入木糖醇不得超过100g。注意事项（1）少数可出现恶心、呕吐、胸闷、心悸、发冷、发热、头痛及疹样过敏反应等，应停止用药。（2）肝昏迷趋向、肾功能不全、血氮过多及氨基酸代谢异常者忌用。严重酸中毒、充血性心衰者慎用。（3）大剂量应用或与电解质合并使用时应测定血清电解质。（4）用前检查，如药液混浊切勿使用。本品应一次用完，不能贮存再用 100Test 下载频道开通，各类考

试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com