

凡命 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E5_87_A1_E5_91_BD_c22_314925.htm 药品名称凡命 英文名称vamin 类别肠道外营养用药制剂注射液：每瓶250ml；500ml。药理及应用本品含有合成人体蛋白质所需的17种必需和非必需氨基酸，能维持营养不良患者的正氮平衡，不含有过量的甘氨酸，可避免发生高氨血症。用于因各种疾病不能进食或需要非凡高能量及氨基酸的患者得到合理营养，促进机体康复。贮存在5~25℃保存。有效期内用。说明本品为由17种氨基酸加电解质组成的微黄色透明溶液。每100ml内含甘氨酸0.21g，L-天门冬氨酸0.41g，L-谷氨酸0.9g，L-丙氨酸0.43g，L-精氨酸0.33g，L-组氨酸0.24g，L-异亮氨酸0.39g，L-亮氨酸0.53g，L-赖氨酸0.39g，L-蛋氨酸0.19g，L-苯丙氨酸0.55g，L-脯氨酸0.81g，L-丝氨酸0.75g，L-苏氨酸0.3g，L-色氨酸0.1g，L-酪氨酸0.04g，L-缬氨酸0.43g，氯化钾0.1006g，氯化钙 $2\text{h}_2\text{o}$ 36.8mg，硫酸镁 $7\text{h}_2\text{o}$ 37mg。渗透压约为700mosm/l，ph为5.2~5.6。用法用量成人：根据病情需要，静脉滴注常用量1日500~2000ml，每分钟滴速约40~50滴。假如同时滴注脂肪乳剂（英特利匹特注射液），1升凡命注射液的滴速应控制在40滴/分，恰好同时输注完毕。新生儿和婴儿：在出生后的第一周内，每24小时按30ml/kg输注。注重事项（1）严重肝损害及和尿毒症者忌用。（2）输注前，需纠正患者电解质、体液和酸碱紊乱。为提高氨基酸的利用，须同时供给葡萄糖、脂肪乳以补充足够能量。此外电解质、微量元素和维生素也须考虑补充。（3）对肾功能损害和用洋地黄治疗的心脏病患者，使用本品要谨慎，因血钾和组织内水平可能不一致，补充钾要注

重。（4）严重疾病早产婴儿，由于有高苯丙氨酸血症的危险，应注重使用。（5）本品不得加入其它药品。注射液发生混浊或沉淀等不应使用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com