

酮咯酸氨丁三醇滴眼剂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/314/2021\\_2022\\_\\_E9\\_85\\_AE\\_E5\\_92\\_AF\\_E9\\_85\\_B8\\_E6\\_c22\\_314938.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/314/2021_2022__E9_85_AE_E5_92_AF_E9_85_B8_E6_c22_314938.htm) 药品名称酮咯酸氨丁

三醇滴眼剂药物别名安贺拉滴眼剂、酮洛酸氨丁三醇 Acular  
英文名称ketorolac tromethamine 类别眼科用药制剂滴眼剂

: 0.5% : 5mL分子式成分酮咯酸氨丁三醇(KT)的分子量  
为376.41。本药0.5%水溶液的pH为7.4。KT有3种结晶型，均  
可溶于水。如较长时间暴露于光线下，这种白色或灰白色的  
结晶物可变色。除活性成分外，本药还含有依地酸二钠、氯  
化钠等，为校正pH而加入盐酸及/或氢氧化钠及纯水，渗透  
压为290 mmol/kg。 药理毒理KT是一种非类固醇抗炎药。眼  
部应用可降低房水内前列腺素E<sub>2</sub>的水平。当眼部仅滴用本药  
的溶酶时，房水内前列腺素E<sub>2</sub>的平均浓度为80 pg/mL，当滴  
用本药时，为28 pg/mL，而对眼内压无明显影响。适应症季  
节性过敏性结膜炎所致的眼部瘙痒及各种眼科手术后炎症。  
用法用量过敏性结膜炎 1滴/次，每日3次滴眼。各种眼科术后  
炎症 手术前24小时开始滴用，1-2 滴/次，每日3-4次滴眼，术  
后继续用3-4周。 注重事项有出血倾向的患者或因接受其它药  
物可致出血时间延长的患者慎用。配戴软性接触镜的患者禁  
用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请  
访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)