

精制白喉抗毒素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E7_B2_BE_E5_88_B6_E7_99_BD_E5_c22_315034.htm 药品名称精制白喉抗毒素

类别人血液制品说明本品系用白喉类毒素免疫马血浆所制得的抗毒素球蛋白制剂，用于治疗 and 预防白喉。用法用量

(1) 出现症状者，及早注射抗毒素治疗。未经类毒素免疫或免疫史不清者，如系密切接触，可注抗毒素紧急预防。也应同时注类毒素，以获得永久免疫。(2) 皮下注射上臂三角肌处，同时注类毒素时部位应分开。肌肉注射应在三角肌中部或臂大肌外上。经皮下注射无异常者方可静脉注射。静脉注射应缓慢，开始每分不超过1ml，以后每分不超过4ml，一次静注不超过40ml，儿童不超过0.8ml / kg。亦可稀释后静滴，静脉滴注前液体宜与体温相近。(3) 用量如下：预防：皮下或肌注每次1000~2000单位。治疗： 一边扁桃体：注射与发病相距24h，应用注射抗毒素剂量8000单位；注射与发病相距48h，应用注射抗毒素剂量16000单位；注射与发病相距72h，应用注射抗毒素剂量24000单位。 二边扁桃体：注射与发病相距24h，应用注射抗毒素剂量16000单位；注射与发病相距48h，应用注射抗毒素剂量32000单位；注射与发病相距72h，应用注射抗毒素剂量48000单位。 二边扁桃体、悬雍垂、鼻咽或喉部：注射与发病相距24h，应用注射抗毒素剂量24000单位；注射与发病相距48h，应用注射抗毒素剂量48000单位；注射与发病相距72h，应用注射抗毒素剂量72000单位。 白喉病变仅限于鼻部：应用注射抗毒素剂量8000~16000单位。注重事项 (1) 本品有液体及冻干二种。

(2) 注射前必须具体记录 (参见皮内注射用卡介苗) 。 (3) 注射用具及部位必须严密消毒。 (4) 注射前必须先做过敏试验 (皮试液为0.1ml抗毒素，加生理盐水0.9ml) 。试验阳性者可作脱敏注射 (将本品稀释10倍后，分小量数次皮下注射，其他详见抗炭疽血清项下) 。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com