

人血丙种球蛋白 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E4_BA_BA_E8_A1_80_E4_B8_99_E7_c22_315087.htm 药品名称人血丙种球蛋白 类别体内诊断制品说明本品系由经乙肝疫苗免疫的健康人血浆中分离提取的免疫球蛋白制剂（主要为igg）。用法用量本品只限肌注，不得用于静脉输注。冻干制剂可用灭菌注射用水溶解，一切操作均按消毒手续进行。预防麻疹：可在与麻疹患者接触7日内按每kg体重注射0.05～0.15ml，或5岁以内儿童注射1.5～3ml，6岁以上儿童最大量不得超过6ml。一次注射，预防效果通常为2～4周。预防传染性肝炎：按每公斤体重注射0.05～0.1ml，或儿童每次注射1.5～3ml，成人每次注射3ml。1次注射，预防效果通常为1个月左右。注重事项（1）本品应为澄明或微带乳光液体，有时有微量沉淀，但可摇散。如有摇不散之沉淀或异物，或安瓶裂纹、过期，均不可使用。（2）安瓶启开后，应一次注毕，不得分次使用。（3）人胎盘丙种球蛋白与本品相同。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com