

肾上腺素具戊酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E8_82_BE_E4_B8_8A_E8_85_BA_E7_c22_315089.htm 药品名称肾上腺素具戊酯药物别名（地匹福林，PROPINE，DIOPINE）英文名称Dipivefrine 类别眼科用药制剂0.1%滴眼剂：每支5ml；8ml。分子式成分系肾上腺素和异戊酸所形成的双酯化合物。药理及应用作用与肾上腺素相似，但比肾上腺素更具有亲脂性，因而能更好地渗入前房，在限内被酶水解成肾上腺素。由于比肾上腺素易于吸收，故少量药物即可发挥较大疗效，其副作用也较肾上腺素低。主要适用于控制慢性开角型青光眼的限内压，常使用于其他药物疗效不佳的患者。由于刺激性较小，对肾上腺素不能耐受的病人，多能耐受本品。0.1%滴眼剂1日2次滴眼，与2%肾上腺素1日2次滴眼相比，疗效稍差，而与2%毛果芸香碱1日4次滴眼的疗效相等。滴眼后30分钟内发生作用，1小时后作用达高峰。用法用量0.1%滴眼剂，每12小时滴1次，每次1滴。注重事项（1）滴后常有烧灼或刺痛感；有的病人还由于畏光、目眩和对光敏感而感到不适。（2）禁用于闭角型青光眼。（3）可能引起肾上腺素的各种副反应，宜注重。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com