

人血白蛋白 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E4_BA_BA_E8_A1_80_E7_99_BD_E8_c22_315163.htm 药品名称人血白蛋白
类别体内诊断制品药理及应用适应症本品对增加循环血容量和维持血浆渗透压起主要作用。每5g白蛋白溶解后，在维持机体胶体渗透压方面，约相当于100ml血浆或200ml全血的功能。用于治疗因失血、创伤及烧伤等引起的休克，脑水肿及大脑损伤所致的脑压增高，防治低蛋白血症以及肝硬化或肾病引起的水肿和腹水，有良好疗效。说明系由经乙肝疫苗免疫健康人的血浆中分离提取制成。有注射液及冻干品两种剂型。用法用量用量由医师酌定。冻干制剂可用5%葡萄糖液或灭菌注射用水溶解，液量根据需要而定。一般根据瓶签所载蛋白量加入适量溶解液使成10%（g/ml）白蛋白溶液，可在15分钟内溶解完毕。当需要获得20%~25%（g/ml）高浓度白蛋白时，则溶解时间较长。一切稀释、注射操作，均应按严格的消毒手续进行。输注方法一般采用静脉滴注，宜使用有滤网的输液器。滴注速度以每分钟不超过2ml（约60滴）为宜，但在开始的15分钟内，速度要缓慢，以后逐渐增加至上述速度。注重事项（1）本品不得分次用，或用后再给第二人输用。（2）有不良反应时，应立即停用。（3）人胎盘血白蛋白与此同。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com