

帕利百 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/315/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B8\\_95\\_E5\\_88\\_A9\\_E7\\_99\\_BE\\_c22\\_315168.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E5_B8_95_E5_88_A9_E7_99_BE_c22_315168.htm) 药品名称帕利百 英文名称Poly Pred 类别眼科用药分子式成分每 mL 眼用混悬液 醋酸泼尼松龙 prednisolone acetate 5 mg，硫酸新霉素 neomycin sulfate 5 mg，硫酸多粘菌素B polymyxin B sulfate 10，000 iu 适应症需要抗炎治疗的眼部疾病，如非化脓性结膜炎、睑炎、巩膜炎、非疱疹性角膜炎、泪囊炎、眼科手术后、异物去除后、化学或热烧伤、擦伤、裂伤或其它眼部创伤时作预防性治疗。 不良反应眼部长长期应用类固醇可能使眼内压升高而致青光眼，也可能致后囊膜下白内障形成。建议用药期间常测眼压。眼部长长期应用皮质类固醇也可能引起角膜变薄，在角膜或巩膜已变薄的患者应用类固醇可能引起眼球穿孔。长期应用该药可能导致非敏感菌过度生长，假如发生双重感染，即应停药并进行适当的治疗。长期用药后若出现眼部慢性炎症的表现，应考虑角膜真菌感染的可能，局部应用皮质类固醇可使伤口愈合延迟。硫酸新霉素有可能引起皮肤过敏。这种反应的发生率尚不清楚。用法用量3~4小时一次，每次一滴，将药液滴于患部，必要时可加大用药频度。注重事项有单纯疱疹病毒感染史者、眼部急性化脓性炎症患者慎用。急性单纯疱疹性角膜炎(树枝状角膜炎)，牛痘、水痘及其它大多数角膜、结膜的病毒感染，眼结核，眼部真菌感染，对该药成分过敏者禁用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)