

冻干布氏菌病活菌苗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E5_86_BB_E5_B9_B2_E5_B8_83_E6_c22_315196.htm 药品名称冻干布氏菌病活菌苗 类别菌苗说明本品系用布氏菌弱毒菌种，经培育后冻干制成。用于预防布氏菌病。用法用量（1）凡与布氏菌病传染源有密切接触者，每年应免疫一次。布氏菌素反应阳性者可不予接种。（2）使用前仔细检查，安瓶绝对不可有裂纹。（3）菌苗按所载人份量加入灭菌生理盐水溶解。每支安瓶10人份，加入0.5ml，溶后之菌苗，应在3小时内用完。（4）于上臂外侧上部皮上划痕接种。在接种处用酒精消毒，待干后，滴上苗苗（每人份0.05ml），再用消毒针划痕。10岁以下儿童及复种者菌苗滴于一处划一个井字，10岁以上初种者苗苗滴于二处划二个井字，间隔2~3cm，划痕长度为1~1.5cm，应以划破表皮微见血迹为宜。划痕处用针涂压10余次，使菌液充分进入痕内。接种后局部应裸露至少5分钟。注重事项（1）患严重疾病、免疫缺陷症者及用免疫抑制剂治疗者禁用。妊娠期及前6个月授乳的妇女禁用。（2）接种后局部反应稍微，少数人划痕处会出现轻度浸润，一般不影响劳动。个别人体温稍高。如因使用途径错误，出现类似急性布氏菌病症状者，要按急性布氏菌病进行彻底治疗。（3）用品仅供皮上划痕用，严禁注射。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com