

短棒状杆菌菌苗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E7_9F_AD_E6_A3_92_E7_8A_B6_E6_c22_315202.htm 药品名称短棒状杆菌菌苗 类别菌苗适应症 (1) 主要用于癌性胸水，结合手术治疗早、中期肺癌。并可合理配合常规治疗方法进行乳腺癌、鼻咽癌、晚期肺癌、黑色素瘤以及癌症的体表转移灶等的治疗。本菌苗对牛皮癣（银屑病）、再生障碍性贫血、女阴白斑、感染性哮喘等也有一定疗效。(2) 用量：浓度为60亿/ml的菌苗，初次注射0.5~1.0ml，以后可酌情逐次增加0.5ml，直至2.0ml。肌内、腔内及多点注射可酌情增量，最多4.0ml（皮下不宜超过2.0ml）。(3) 一般为皮下或肌内注射。腔内注射以氯化钠注射液进行适当稀释。瘤内或瘤周采用上述用量，行多点注射，以减轻局部反应。女阴白斑等则可在局部涂擦，每日1次，每次1~2ml，症状减轻后，可根据需要，延长用药间隔。说明本品系用具有免疫调节及抑瘤等活性的厌氧短棒状杆菌制成，每ml含菌体60亿。注重事项 (1) 注射局部常有肿痛、硬结，持续约两周，有时出现一过性发热。胸腔注射可有一过性反应加重及发热，可对症处理。(2) 发热在38℃以上，重症心血管病人，肝、肾功能异常者禁用。(3) 治疗前后，宜作血、尿常规及免疫功能等检查，出现常规或免疫指标持续下降者停用，注射后当日勿过度疲惫。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com