卵磷脂络合碘 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E5_8D_B5_ E7_A3_B7_E8_84_82_E7_c22_315219.htm 药品名称卵磷脂络合 碘药物别名沃丽汀 Joletin 英文名称iodizedlecithin 类别眼科用 药制剂片剂,每片含卵磷脂络合碘1.5mg(含碘量100μg)。分 子式成分化学名:二 -()-磷脂基胆碱二碘。药理毒理】 由消化道呼吸到血液中,以无机碘的形式起作用,然后结合 入甲状腺并对由于缺乏碘引起的甲状腺肿患者或儿童的甲状 腺机能减退起作用。 促进家兔视网膜组织呼吸,增进视网 膜的新陈代谢。 对兔的过敏性眼色素层(葡萄膜)炎或暴 发性眼色素层炎的实验中,都有明显的抗炎作用和改善ERG 的作用。药 动 学po600 µ g后,大部分成为无机碘在血中被吸 收,给药后1h达峰值。24h内由尿排出,粪中排出量为10%以 下。 适应症血管痉挛性视网膜炎、出血性视网膜炎、玻璃体 出血、玻璃体混浊、中心静脉闭合性视网膜炎和婴儿哮喘、 支气管炎、缺碘性甲状腺肿、缺碘性甲状腺机能减退。不良 反应 高过敏性:药量突减会偶然引发。 消化道反应:偶 然发生胃肠不适。用法用量成人常规剂量300~600 µ g/d, po , bid或tid。 注重事项 慢性甲状腺疾病患者,曾患突眼性甲 状腺肿的患者,内源性甲状腺素合成不足的患者慎用。 由 于老年人生理机能降低,应在使用时适当减量并小心监护。

本品对妊娠妇女或疑为妊娠的妇女,只有在治疗价值大于可能带来的风险时,方可使用。 须遵医嘱使用。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com