

人用浓缩狂犬病疫苗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/315/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_BA\\_E7\\_94\\_A8\\_E6\\_B5\\_93\\_E7\\_c22\\_315227.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/315/2021_2022__E4_BA_BA_E7_94_A8_E6_B5_93_E7_c22_315227.htm) 药品名称人用浓缩狂犬病疫苗 类别疫苗适应症用于预防感染狂犬病风险大的健康人，如畜牧人员、实验室工作人员等，或用于治疗狂犬病病毒感染者。不良反应有局部红肿、疼痛、硬结和发热、头痛、不适、皮疹等。用法用量（1）凡被狂犬或其它疯动物咬伤、抓伤时，应立即处理局部伤口（用肥皂水反复冲洗后，再用碘酊消毒数次），并及时注射本疫苗。（2）一般咬伤者于0（第1天，注射当天）、3（第4天，以下类推）、7、14、30天各注射本疫苗1安瓶（液体疫苗2ml，冻干疫苗1ml或2ml），儿童用量相同。严重咬伤者（头、面、颈、手指、多部位3处以上咬伤、咬穿皮肤或舔触粘膜者），应按上述方法注射本疫苗，并于0、3天注射加倍量疫苗，于0天注射疫苗的同时合用狂犬病血清（咬伤局部浸润与肌肉注射）。凡联合使用抗狂犬血清者，必须在全程疫苗注射完毕后再注射2~3针加强针，即在全程注射后第15、75天，或第10、20、90天加强。（3）本疫苗供上臂三角肌或臀部肌肉注射。（4）使用前将疫苗振摇成均匀悬液，冻干疫苗则加入等量灭菌注射用水溶解。（5）对未咬伤的健康者预防注射，可于第1、8、21天注射3针。注重事项（1）本疫苗应用无禁忌证。（2）注射疫苗期间可照常工作，切忌饮酒、浓茶等刺激性食物及剧烈劳动与运动等，以避免引起反应。（3）伤口不宜包扎或缝口。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)